

ترشاوہ پھلوں کی بہترین پیداوار لکی کوراندسٹریز کراپ مینجمنٹ پروگرام کے ساتھ



ایل سی آئی امائیٹو



ایل سی آئی امائیٹو، امائیٹو ایسڈز اور دیگر مائیکرو نیوٹریٹس پر مشتمل ایک منفرد فارمولا ہے۔ جو پودے کیلئے ایک مکمل نامیاتی غذا ہے اور پودے کی بڑھوتری اور پیداواری مرحلے پر استعمال کیلئے یکساں مفید ہے۔ ایل سی آئی امائیٹو کے استعمال سے قوت مدافعت بڑھنے سے پودے غیر حیاتاتی دباؤ سے محفوظ رہتے ہیں اور فصلوں کی پیداواری کوالٹی اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔

گلائی فاسٹ



گلائی فاسٹ وسیع دائرہ عمل والا منفرد جڑی بوٹی مارز ہر ہے جو تمام اقسام کی دائمی سالانہ اور سخت جان جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

اقسام جڑی بوٹیاں	مقدار فی ایکڑ
سالانہ، دائمی اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں	2000-1500 ملی لیٹر فی ایکڑ

اکیڈو



اکیڈو ایک موثر اور وسیع العمل کیڑے مارز ہر ہے اس میں موجود ہر کیڑوں کو ہلاک کرنے کی بے مثال طاقت کی وجہ سے سنڈیوں کے انڈے ضائع کرنے اور رس چوسنے والے کیڑوں کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

ایماڈوکس



ایماڈوکس دور حاضر کا منفرد پروڈکٹ ہے جو لشکری اور امریکن سنڈی پر بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے ایماڈوکس کے اسپرے سے سنڈیاں فوراً مفلوج ہو کر نقصان پہنچانا بند کر دیتی ہے اور چند ہی گھنٹوں میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

فرٹی میکرو



فرٹی میکرو پودوں میں ضروری خوراک کی اجزا کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے فرٹی میکرو 100 فیصد پانی میں حل پذیر ہے اور پتوں کے ذریعے با آسانی جذب ہو جاتا ہے۔

فصل	مقدار استعمال	وقت استعمال
باغات	2 کلوگرام (فی 100 لیٹر پانی میں)	پہلا اسپرے پھول آنے سے پہلے کریں 20 سے 30 دن کے وقفے سے دوسرا اور تیسرا اسپرے کریں

فرٹی کے 50



فرٹی کے 50 پانی میں حل پذیر رکھا دے جس میں پوٹاش کے علاوہ سلفر کی اضافی مقدار بھی موجود ہے جو پودے کی افزائش، طاقت اور پیداوار کے لئے ضروری ہے فرٹی کے 50 کے استعمال سے فصل کی پیداواری کوالٹی اور وزن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

فصل	مقدار استعمال	وقت استعمال
باغات	2 کلوگرام (فی 100 لیٹر پانی میں)	پھل بننے کے بعد اسپرے کریں اور 15 دن کے وقفے سے دہرائیں

فرٹی بیوما

فرٹی بیوما زمین میں نامیاتی مادے کی کمی پوری کرتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔

فصل	مقدار استعمال	وقت استعمال
باغات	100 سے 150 گرام فی پودا	دوسری کھادوں کے ساتھ ملا کر

زنگرین

زنگرین پودے میں زنک اور سلفر کی کمی پوری کرتا ہے جو کہ زمین کی زرخیزی پودوں کی بڑھوتری اور بہتر پیداوار کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ زنگرین دانے دار ہونے کی وجہ سے چھلنے کرنے میں انتہائی آسان ہے۔

فصل	مقدار استعمال	وقت استعمال
باغات	100 سے 150 گرام فی پودا	پھول آنے سے پہلے چھلے کریں

فرٹی یوریا

فرٹی یوریا ایک منفرد کھاد ہے جو اپنی جدید کوٹنگ ٹیکنالوجی کی وجہ سے فصلوں کو لمبے عرصے تک نائٹروجن اور سلفر کی فراہمی یقینی بناتا ہے یہ زمینی اصلاح کار کے طور پر کام کرتا ہے اور پودوں کو دیگر خوراک کی اجزاء کی دستیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

فصل	مقدار استعمال	مرحلہ
ترشاوہ پھل	1 کلو گرام فی پودا (10 سال سے زائد عمر کے پودوں کیلئے)	پہلی مرتبہ فوری کے مہینے میں چھلے کریں دوسری مرتبہ اپریل کے آخر تک چھلے کریں تیسری مرتبہ ستمبر کے مہینے میں چھلے کریں

میکسل

میکسل حفاظتی اور معالجاتی اثر سے بیماریوں کا مکمل خاتمہ کرتا ہے پتوں کے علاوہ جڑوں سے بھی سرائیت پذیر ہے میکسل پودے کی سطح پر تہہ بنا کر پھپھوندی کے نظام تنفس کو متاثر کرتا ہے اور سرائیت پذیری کی وجہ سے پھپھوندی کی بڑھوتری اور افزائش نسل رکنے سے بیماریوں کا پھیلاؤ ناممکن ہو جاتا ہے۔

ایزوسٹار

ایزوسٹار دو پھپھوندی کش زہروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے پودوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ حفاظتی اور معالجاتی دونوں مقاصد کے لیے یکساں موزوں ہے۔ ایزوسٹار اپنے مختلف طریقہ اثر کی بدولت بیماریوں پر مکمل اور دیر پا کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

سلفوم

سلفوم ایک وسیع الاثر پھپھوندی کش زہر ہے۔ سلفوم پودوں میں سلفر کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے سلفوم کی پودوں پر چپکنے کی صلاحیت کی وجہ سے بارش میں اس کا اثر زائل نہیں ہوتا بہترین نتائج کے لیے سلفوم کو بیماری کی علامات نمودار ہونے سے پہلے استعمال کریں۔



کی کور انڈسٹریز لمیٹڈ۔ ایگری سائنسز
63-مرنگ روڈ لاہور۔
ہیپ لائن: 0800-73337

