


مرچ کی منافع بخش
اور معیاری پیداوار کے لیے
کراپ مینجمنٹ پروگرام

فرٹی کے 50

فرٹی کے 50 پانی میں حل پذیر کھاد ہے جس میں پوٹاش کے علاوہ سلفر کی اضافی مقدار بھی موجود ہے جو پودے کی افزائش، طاقت اور پیداوار کے لئے ضروری ہے۔ فرٹی کے 50 کے استعمال سے فصل کی پیداواری کوالٹی اور وزن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔



سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
2 کلوگرام	پھل بننے کے بعد اسپرے کریں اور 15 دن کے وقفے سے دُہرائیں

مائنیکٹو اِیکسٹرا



مائنیکٹو اِیکسٹرا وسیع دائرہ اثر والا جدید زہر ہے جو لمسی اور شکمی طریقہ اثر کی بدولت سنڈیوں کے جسم سے کیلشیم آئینز کے بہاؤ کو متاثر کر کے پٹھوں کی حرکت کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے۔ اور سنڈیوں کی بیرونی جلد کائٹن کو بننے سے روک دیتا ہے جس کی وجہ سے نقصان دہ کیڑے سست اور مفلوج ہو کر خوراک لینا بند کر دیتے ہیں اور بلآخر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

ڈیکوڈ



ڈیکوڈ لمسی اور شکمی طریقہ اثر سے کیڑوں کا خاتمہ یقینی بناتا ہے۔ **ڈیکوڈ** رَس چوسنے والے کیڑوں اور سُنڈیوں میں بننے والی توانائی کو روک کر پٹھوں کو کمزور کر کے کیڑوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔

میکسل

میکسل دو پھپھوندی کُش زہروں پر مشتمل منفرد کیمیا ہے **میکسل** پودے کی سطح پر تہہ بنا کر پھپھوندی کے نظامِ تنفس کو متاثر کرتا ہے جس سے پھپھوندی کے سپورز کا اُگاؤ رُک جاتا ہے اور سرائیت پذیری کی وجہ سے پھپھوندی کی بڑھوتری اور افزائشِ نسل رُکنے سے بیماریوں کا پھیلاؤ ناممکن ہو جاتا ہے



سفارشات برائے استعمال

بیماری	مقدار فی ایکڑ	وقت استعمال
نوخیز پودوں کا مرجھاؤ/کالرراٹ	200-250 گرام فی 100 لیٹر پانی	بیماری نمودار ہوتے ہی اسپرے کریں
جڑ کا گلاؤ	500 گرام	

مائنیکٹو فورٹ
480 ایس سی

مائنیکٹو فورٹ منفرد زہروں پر مشتمل ایک جدید کیمسٹری ہے جو کہ سفید مکھی (بالغ اور بچے) اور دوسرے رس چوسنے والے کیڑوں کے نظام تنفس اور آر وائے آر (RYR) کے غیر منظم ایکٹیویشن (Activation) کے ذریعے کیڑوں کا مؤثر خاتمہ کرتا ہے۔ اسپرے کے فوراً بعد ہی کیڑوں کے خوراک لینے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ یہ زہر پتوں کے آر پار (Translaminar) جذب ہونے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے چھپے ہوئے کیڑوں پر دیرپا اور مکمل کنٹرول فراہم کرتا ہے۔



LCI
LUCKY CORE INDUSTRIES

#JourneyOfEnrichingLives

YBG

لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ۔ ایگری سائینسز
63-مزنگ روڈ لاہور۔
ہیلپ لائن: 0800-73337

پینڈینٹ

پینڈینٹ ایک وسیع الاثر زہر ہے جو چوڑے پتے اور گھاس نُما خاندان کی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔



سفارشات برائے استعمال

جڑی بوٹی	مقدار فی ایکڑ
اِٹ سِٹ، باتھو، کرنڈ، چولائی، کلفا، بلی بوٹی، سوانکی گھاس	1 تا 1 1/2 لیٹر فی ایکڑ

زنگرین

زنگرین پودے میں زنک اور سلفر کی کمی پوری کرتا ہے۔
زنگرین دانے دار ہونے کی وجہ سے چھڑکنے میں انتہائی آسان ہے۔



سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
3 کلوگرام فی ایکڑ	پھول آنے سے پہلے چھڑکیں

ایل سی آئی امائینو

امائینو ایسڈز اور دیگر مائیکرو نیوٹرینٹس پر مشتمل ایک منفرد فارمولا ہے جو پودے کیلئے ایک مکمل نامیاتی غذا ہے اور پودے کی بڑھوتری اور پیداواری مرحلے پر استعمال کیلئے یکساں مفید ہے۔



فرٹی ہیوما

فرٹی ہیوما زمین میں نامیاتی مادے کی کمی پوری کرتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔



سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
8 کلوگرام فی ایکڑ	دوسری کھادوں کے ساتھ ملا کر

کاک پِٹ

کاک پِٹ ایک منفرد بائیو اسٹیمولینٹ (Bio-Stimulant) پر مشتمل بہترین پراڈکٹ ہے جو کہ پودوں میں روٹ اور شوٹ سسٹم کی بڑھوتری اور نشوونُما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ **کاک پِٹ** پودے کے اندر خوراک کے بہاؤ کے علاوہ ساخت اور قوتِ مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ **کاک پِٹ** پودوں میں غیر حیاتیاتی دباؤ کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔



سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
100 ملی لیٹر کو 100 لیٹر پانی میں حل کریں	پہلا اسپرے پنیری منتقلی کے 15-20 دن بعد/ دوسرا اسپرے پہلے اسپرے کے 15 دن بعد

سلفوم

سلفوم ایک وسیع الاثر پھپھوندی کش زہر ہے۔ **سلفوم** پودوں میں سلفر کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ **سلفوم** کی پودوں پر چپکنے کی صلاحیت کے وجہ سے بارش میں اس کا اثر زائل نہیں ہوتا بہترین نتائج کے لیے **سلفوم** کو بیماری کی علامات نمودار ہونے سے پہلے استعمال کریں۔

