

# جمبو

جمبو کا وعدہ۔ چارہ بہت زیادہ

بیجائی ایک بار، کٹائی بار بار



آسٹریلیا سے  
درآمد شدہ



#JourneyOfEnrichingLives

کی کوراٹانسٹر برلمینڈ۔ ایگری سائنسز  
63- مزنگ روڈ لاہور۔  
ہیلپ لائن: 0800-73337



LCI  
LUCKY CORE INDUSTRIES

YBC

## کھادوں کا استعمال

کھادوں کا استعمال زمین کی زرخیزی اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

بیجائی کے وقت	2 بوری نائٹرو فاسفیٹ + 1 بوری پوناش
پہلے پانی کے وقت	1 بوری امونیم نائٹریٹ یا 1/2 بوری یوریا
ہر کٹائی کے بعد	1 بوری امونیم نائٹریٹ یا 1/2 بوری یوریا
ہر کٹائی کے 20 دن بعد	1 بوری امونیم نائٹریٹ یا 1/2 بوری یوریا
فرضی ہیبوما ہاہیم بیسٹ	زمین کی تیاری کے وقت 8 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں

## آبیاری کا عمل

پہلا پانی بیجائی کے 20-25 دن بعد دیں تاکہ بیج زمین میں اچھی طرح جڑ پکڑ لے۔ اس کے بعد موسم کی مناسبت سے پانی دیں۔ اگر موسم زیادہ گرم ہو تو پانی کا وقفہ کم کر دیں۔ آبیاری کا عمل موسمی حالات، زمین اور فصل کی ضرورت کے مطابق کریں۔

## جڑی بوٹیوں کی تلفی

جڑی بوٹیوں کی تلفی انتہائی اہم عمل ہے۔ جڑی بوٹیاں فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں اور غذائیت کو اثر انداز کرتی ہیں۔ لہذا اکسان حضرات گوڈی کے عمل پر توجہ دیں۔ یا سفارش کردہ جڑی بوٹی مارا دیات کا بروقت استعمال کریں۔

## کیڑوں کی روک تھام

\* اکیڈو 2.5 فیصد (w/v) ای سی فصل پر شوٹ فلانی / اہور کا حملہ نظر آنے کی صورت میں 300 - 250 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں

نوٹ: کیڑوں کے حملے کی صورت میں کی کوراٹانسٹر برلمینڈ کے نمائندوں کے مشورے سے زہر کا استعمال کریں۔

## کٹائی

فصل جب تین سے چار فٹ (1 میٹر) ہو جائے تو کٹائی کا صحیح وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت چارے کی غذائیت اور لذت عروج پر ہوتی ہے۔ بروقت کٹائی کا عمل انتہائی ضروری ہے تاکہ پودا اپنی بڑھوتری قائم رکھ سکے اور جمبو سے زیادہ سے زیادہ کٹائیاں حاصل کی جاسکیں۔ کٹائی کا عمل سطح زمین سے 5-6 انچ کی اونچائی پر کریں تاکہ پودے سے چھوٹے والی شاخیں متاثر نہ ہوں۔

\* نوٹ: کھیتی صرف بیج کے اگاؤ اور خالص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی کھیتی کی ذمہ دار نہ ہوگی۔

## جمبو کا دوسرے چارہ جات سے تقابلی جائزہ

چارہ	پیداواری صلاحیت/ ایکڑ (منوں میں)	پروٹین	پتے کا تنے سے تناسب (%)
جمبو	2000±1500	11.0	1.22
سدا بہار	1200±800	7.30	0.90
جوار	300±200	7.00	0.32
مکئی	350±250	9.50	0.32

## کاشت کیلئے سفارشات

آخر فروری تا اپریل جمبو کی کاشت کیلئے انتہائی موزوں ہے۔ البتہ جمبو کو جون تک بھی کاشت کیا جاسکتا ہے۔  
\* دھیان رہے کہ دیر سے کاشت کرنے کی صورت میں کٹائیاں کم ہو سکتی ہیں۔

\* نوٹ: کاشتکار حضرات مقامی موسم کے مطابق وقت کاشت کا تعین کریں۔

10 کلوگرام فی ایکڑ

بہترین پیداوار کے لئے جمبو کو جہاں تک ممکن ہو سکے قطاروں میں کاشت کریں۔ مطلوبہ 6-5 کٹائیاں کے حصول کیلئے گندم والی ڈرل (ریج ڈرل) کی ایک نالی بند کر کے قطار سے قطار کا مطلوبہ فاصلہ تقریباً 1.5 فٹ حاصل کیا جاسکتا ہے۔



## وقت کاشت

## شرح بیج

## طریقہ کاشت



## نمایاں خصوصیات

- ★ پتے کا تنے سے تناسب زیادہ
- ★ پھول آنے کا عمل انتہائی تاخیر سے نتیجتاً چارہ سرسبز اور غذائیت سے بھرپور (بروقت کاشت کی صورت میں تقریباً 180 دن تک پھول نہیں آتے)
- ★ کٹائی کے بعد جلد افزائشی صلاحیت (Excellent Resprouting)
- ★ انتہائی دیکھ بھال کی صورت میں جمبو 5-6 کٹائیاں فراہم کرتا ہے
- ★ ناموافق موسمی حالات میں بھی جمبو اپنی بڑھوتری قائم رکھتا ہے
- ★ خشک چارے کے طور پر ذخیرہ کرنے کی مدت زیادہ

پاکستان دودھ کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر ہے اور سالانہ ملکی دودھ کی پیداوار تقریباً 7 کروڑ ٹن ہے۔ اس کے باوجود پاکستان ہر سال 20 ارب روپے دودھ اور ڈیری مصنوعات کی درآمد پر خرچ کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دودھ کی ملکی پیداوار کو بڑھایا جائے۔ ڈیری ماہرین کے مطابق منافع بخش ڈیری فارمنگ کیلئے کسی بھی ڈیری فارم پر جانور کی اعلیٰ نسل اور جانوروں کی بہترین نگہداشت کے ساتھ اعلیٰ معیار اور غذائیت سے بھرپور چارے کی فراہمی بھی بہت ضروری ہے۔

لکی کورائنڈسٹریز لمیٹڈ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ زراعت کے شعبہ میں عرصہ دراز سے جدت اور زمینداروں کے مسائل کے حل کیلئے کوشاں ہے۔ لکی کورائنڈسٹریز لمیٹڈ سال ہا سال سے غذائیت سے بھرپور، اعلیٰ معیار کا آسٹریلیا سے درآمد شدہ بائیر ڈ چارے کا بیج جمبو اپنے زمیندار بھائیوں کیلئے مارکیٹ میں مہیا کر رہا ہے جس کی نمایاں خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

## جمبو جانوروں کیلئے بہترین انتخاب

- ★ چارے کے ہضم ہونے کی صلاحیت زیادہ
- ★ گوشت اور دودھ کی پیداوار میں مددگار
- ★ ذائقے میں مٹھاس، چارہ مزیدار
- ★ جانوروں کی بہتر صحت
- ★ جانوروں کو متوازن غذا کی مسلسل فراہمی

