

ہائی اولا - 401

آپ کے اعتماد کا ضامن
بہترین پیداواری صلاحیت کے ساتھ ایک بار پھر




کلی کور انڈسٹریز لمیٹڈ - ایگری سائنسز
63- مزنگ روڈ، لاہور۔ ہیلپ لائن: 0800-73337

#JourneyOfEnrichingLives

وقت برداشت

مندرجہ ذیل بتائی گئی وقت برداشت کی سفارشات عمل کرتے ہوئے بیج گرنے کی شرح میں کمی ممکن ہو سکتی ہے۔

- کھیت سے مختلف جگہوں سے دس پودے لیں
- پودے کی بنیادی شاخ سے چار سے پانچ پھلیاں توڑ لیں اور بیجوں کو کسی سفید کاغذ یا برتن میں نکال لیں
- اگر %40-50 بیج بھورے، %50-60 بیج سبزی مائل ہوں تو فصل کاٹ لیں اور 10-15 دن تک دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیں



کیڑے اور ان کا تدارک

ٹو کے (Cutworm) سے بچاؤ کیلئے 330 ملی لیٹر **اکیڈو** کا اسپرے کریں۔

ست تیلے (Aphid) سے بچاؤ کیلئے 60 گرام فی ایکڑ **اولا** اسپرے کریں۔

کماد/باغات کے ساتھ مخلوط کاشت

کینولا کو ستمبر کماد کے ساتھ کاشت کیا جاسکتا ہے۔ جہاں پر قطار سے قطار کا فاصلہ اڑھائی فٹ ہو وہاں کماد کی ایک قطار چھوڑ کر کینولا کی کاشت کریں۔ اس طرح ایک ایکڑ کماد میں آدھا ایکڑ کینولا کاشت ہوگا اور کماد کی فصل پر کوئی منفی اثر نہیں آئے گا۔ مشاہدات میں آیا ہے کہ کینولا کو باغات میں بھی کامیابی کے ساتھ مخلوط کاشت کیا جاسکتا ہے۔

نوٹ: کپنی صرف بیج کے اگاؤ اور خالص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی کپنی ذمہ دار نہ ہوگی۔

63- مزنگ روڈ، لاہور۔ ہیلپ لائن: 0800-73337

کلی کور انڈسٹریز لمیٹڈ - ایگری سائنسز

کامیاب کاشتکاروں کا راز "Hyola 401"



نام: ولید احمد
علاقہ: مردان

پیداوار: 24 من فی ایکڑ

نام: مبشر عباس
علاقہ: ملتان



پیداوار: 25 من فی ایکڑ



نام: محمد جہانگیر
علاقہ: ملتان

پیداوار: 28 من فی ایکڑ

نام: حماد حسین
علاقہ: تلہ گنگ



پیداوار: 25 من فی ایکڑ



ہائی اولا-401

- بہترین پیداواری صلاحیت
- درمیانہ قد، فصل گرنے سے محفوظ
- فصل جلد اور ایک وقت میں پک کر تیار
- پھلیوں کی تعداد زیادہ
- بیجوں میں تیل کی مقدار بہت زیادہ
- تیل مضر صحت اجزاء سے پاک
- ابتدائی بڑھوتری تیز ہونے کی وجہ سے جڑی بوٹیوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت
- بیماریوں اور کیڑوں کے حملے کے خلاف قوت برداشت
- سخت موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت



عمدہ پیداوار



پھلیوں کی تعداد زیادہ



کاشت کیلئے سفارشات

وقت کاشت

علاقہ	وقت کاشت
بالائی پنجاب اور خیبر پختونخواہ	وسط ستمبر۔ آخر اکتوبر
زیریں پنجاب اور بالائی سندھ	آخر ستمبر۔ وسط نومبر
زیریں سندھ	وسط ستمبر۔ آخر اکتوبر

نوٹ: زمیندار حضرات اپنے علاقے اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تجویز کردہ وقت کاشت میں تبدیلی لاسکتے ہیں۔


شرح بیج

2 کلوگرام فی ایکڑ

طریقہ کاشت

اگرچہ کینولا کو بذریعہ چھٹہ کاشت کیا جاسکتا ہے تاہم بہترین پیداواری نتائج کے حصول کیلئے کینولا کولائیٹوں میں کاشت کریں جس کے لئے سہل سید ڈرل (Small Seed Drill) کا استعمال کریں۔

قطار سے قطار کا فاصلہ	1.5-2 فٹ
پودے سے پودے کا فاصلہ	4-15 انچ
بیج کی گہرائی	0.5-1 انچ



اگر فصل اگیتی کاشت کی جا رہی ہو تو بیج کی گہرائی 1 انچ تک رکھیں اور وتر میں کاشت کریں کیونکہ گرم موسم میں زمین کی اوپر کی سطح میں نمی کم ہو سکتی ہے۔ بیج کا بہتر اگاؤ حاصل کرنے کیلئے دوہری راؤنی کریں۔

کھاد کا استعمال

بیجائی کے وقت	1 بوری ڈی اے پی + 1 بوری پوناش یا 2 بوری نائٹرو فاس اور 1 بوری پوناش
پہلے پانی کے ساتھ	1 بوری یوریا
دوسرے پانی کے ساتھ	1/2 بوری یوریا
فرٹی میسر	1-2 کلوگرام فی ایکڑ 6-8 پتوں کی حالت پر اسپرے کریں
فرٹی کے 50	پھول بننے کے بعد 2 کلوگرام فی ایکڑ اسپرے کریں یا 10 کلوگرام فی ایکڑ فلڈ کریں

نوٹ: کھاد کا استعمال زمین کی ذرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

آبیاری

پہلا پانی	بیج کے اگاؤ کے 25 سے 30 دن بعد
دوسرا پانی	پہلے پانی سے 10-15 دن بعد
تیسرا پانی	پھول بننے وقت
چوتھا پانی	بیج بننے وقت

نوٹ: موسمی حالات اور بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کی مقدار اور وقفے میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔

کامیاب کاشتکاروں کا راز “Hyola 401”



نام: محمد آصف سردار
علاقہ: سرگودھا

پیداوار: 22 من فی ایکڑ

نام: نصیر احمد
علاقہ: سرگودھا



پیداوار: 26 من فی ایکڑ



نام: عبدالقادر خان
علاقہ: میانوالی

پیداوار: 23 من فی ایکڑ

نام: رضوان خان
علاقہ: میانوالی



پیداوار: 27 من فی ایکڑ