دھان کی کاشت کیلئے شاندار ہائبرڈ بیج





HS-98 | HDR-16

جڑی بوٹیوں کی تلفی



پنیری کی منتقلی کے 1 سے 3 دن کے اندر جڑی بوٹیوں کو اُگنے سے پہلے کنٹرول کرنے کیلئے **دوآبہ** 500 ملی لیٹر فی ایکڑ چھڑکاؤ کریں۔

دھان کی سالانہ جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کے لیے لاب کی منتقلی/فصل کی کاشت کے 15-20 دن بعد یا جب جڑی بوٹیاں 2-4 پتوں کی حالت پر ہوں تو جڑی بوٹی مار نوزل سے 100-120 لیٹر پانی میں **ڈاؤکڈا** ملا کر اسپرے کریں۔

کیڑوں کا تدارک

پتہ لپیٹ سنڈی سے بچاؤ کے لئے **مائنیکٹو ایکسٹرا** 15 ملی لیٹر فی ایکڑ اسپرے کریں اور **ٹاپ رائس** 9 کلوگرام فی ایکڑ چھڑکیں۔



آبپاشی کا عمل

پنیری کی منتقلی کے وقت کھیت میں کم از کم 2 انچ تک پانی کھڑا ہونا چاہیئے۔ اس کے بعد کھیت میں پانی 3 انچ سے زیادہ نہ ہو۔ مونجر نکلنے سے دانہ بننے تک پانی کی کمی نہ آنے دیں۔ کٹائی سے تقریباً 2 ہفتے پہلے پانی دینا بند کر دیں۔

فصل کی برداشت

جب مونجر سنہری مائل ہو جائے اور دانوں کی بھرائی مکمل ہو جائے تو فصل کی برداشت کی جا سکتی ہے۔

نوٹ: کمپنی صرف بیج کے اُگاؤ اور خالص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی بیشی کی کمپنی ذمہ دار نہ ہوگی۔

LCI
LUCKY CORE INDUSTRIES

#JourneyOfEnrichingLives

لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ۔ ایگری سائنسز
63-مزنگ روڈ لاہور۔
ہیلپ لائن: 0800-73337

HDR-16

ملرز کی اولین پسند







- ★ بہترین پیداواری صلاحیت
- ★ مختلف موسمی حالات میں دے بہترین پیداوار
- ★ زیادہ جھاڑ، لمبے مونجر
- ★ لمبے اور خوش نما دانے
- ★ 100-105 دن میں پک کر تیار
- ★ درمیانہ قد، فصل گرنے سے محفوظ
- ★ کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت

HS-98

مختلف موسمی حالات میں بہترین پیداوار







- ★ صحت مند اُگاؤ بہترین پیداواری صلاحیت
- ★ وزن دار دانے
- ★ مناسب قد، فصل گرنے سے محفوظ
- ★ غیر موافق موسمی حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت
- ★ بیماریوں کے خلاف قوتِ مدافعت
- ★ زیادہ جھاڑ، لمبے مونجر، زیادہ دانے
- ★ 100-105 دن میں پک کر تیار

کاشت کیلئے سفارشات

وقتِ کاشت

پنجاب	وسط مئی۔ وسط جون
لوئر سندھ	آخر اپریل۔ جون
اپر سندھ	مئی۔ جون

نوٹ: کاشتکار حضرات مقامی موسم کے مطابق وقتِ کاشت کا تعین کریں۔

شرح بیج

5 کلوگرام فی ایکڑ

پنیری کی تیاری

ایک ایکڑ ہائبرڈ دھان کی کاشت کیلئے 5-6 مرلہ رقبے پر پنیری کاشت کریں۔ **یولو انباؤ** کو (2.3-2.95 ملی لیٹر فی کلو گرام بیج) لگا کر کاشت کریں۔ کاشت کے 25 دن بعد پنیری کی کھیت میں منتقلی 4-5 پتوں کی حالت پہ کی جاسکتی ہے۔

پنیری کی منتقلی

فی ایکڑ پودوں کی مطلوبہ تعداد (90 ہزار۔ 1 لاکھ) کے حصول کیلئے پنیری منتقل کرتے وقت کھیت میں کم از کم 2 انچ تک پانی کھڑا ہونا چاہیئے اور فی سوراخ (Hill) 2 پودے لگائیں۔

قطاروں کا درمیانی فاصلہ	7-8 انچ
پودوں کا درمیانی فاصلہ	7-8 انچ





پنیری کی کھیت میں منتقلی



پنیری کی کاشت

کھاد کا استعمال

کھادوں کا استعمال زمین کی زرخیزی اور ضرورت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کریں۔

زمین کی تیاری	1 بوری ڈی اے پی + 1 بوری پوٹاش + **فرٹی ہیما** 8 کلوگرام فی ایکڑ
زنگرین (دانے دار)	پنیری منتقلی کے 15 دن بعد 7.5 کلوگرام فی ایکڑ چھٹہ کریں۔
کاک پٹ	پہلا اسپرے بیجائی کے 15-20 دن بعد/دوسرا اسپرے پہلے اسپرے کے 15 دن بعد
پنیری منتقلی کے 3 ہفتے بعد	1 بوری یوریا
پنیری منتقلی کے 6 ہفتے بعد	1 بوری یوریا
ایل سی ای امائینو	500 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں پہلا اسپرے جھاڑ مکمل ہونے پر اور دوسرا اسپرے گوبھ کی حالت میں (بہتر فلیگ لیف ظاہر ہونے پر)
فرٹی کے 50 یا **فرٹی کے (K)**	گوبھ کی حالت سے مونجر بننے سے پہلے 10 کلوگرام فی ایکڑ بذریعہ آبپاشی فلڈ کریں۔
	3 لیٹر فی ایکڑ بذریعہ آبپاشی فلڈ کریں۔