

ٹماٹر کی کاشت کیلئے بہترین ہائبرڈ بیج

ایڈوانٹا F1 1225

نمایاں خصوصیات

- کھیت میں منتقلی کے 60-65 دنوں میں پھل چنائی کے لئے تیار
- پھل کا اوسط وزن 100-120 گرام
- چمکدار گہرے سُرخ رنگ کا چوکور نما (square) پھل
- گرمی میں بھی پھل اٹھانے کی بھرپور صلاحیت
- بہترین پتوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے پھل دھوپ کے اثرات سے محفوظ
- بہترین شلف لائف، دور دراز کی منڈیوں تک رسائی آسان
- بیماریوں، وائرس اور گرمی کے خلاف بہترین قوتِ برداشت

لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ۔ ایگری سائنسز
63-مزنگ روڈ، لاہور۔ ہیلپ لائن: 0800-73337

#JourneyOfEnrichingLives

LCI
LUCKY CORE INDUSTRIES

کاشت کیلئے سفارشات

وقتِ کاشت

پنجاب	سندھ	خیبر پختونخواہ	بلوچستان
اگست۔دسمبر	ستمبر۔دسمبر	جنوری/ فروری۔مارچ (مانسہرہ) / وسط جون۔وسط اگست (سوات/مہمند)	اکتوبر۔نومبر

نوٹ: بجائی کا فیصلہ اپنے مقامی موسم کو مدِنظر رکھتے ہوئے کریں

شرح بیج	60 گرام فی ایکڑ

پودوں کی تعداد	9000-10000 فی ایکڑ

پنیری کی تیاری

ایک فٹ اونچے، 4 فٹ چوڑے اور 6 فٹ لمبے بیڈز (Beds) بنالیں۔ چوڑائی کے رخ آدھا انچ گہری لائنیں بنالیں جن کا درمیانی فاصلہ کم از کم 2 انچ ہو۔ بیج ان لائنوں میں اس طرح ڈالیں کہ ایک دوسرے کے اوپر نہ آئیں۔ پنیری کی کھیت میں منتقلی 4-6 پتوں کی حالت پر کریں۔

کھیت میں منتقلی

قطار سے قطار کا فاصلہ	6 فٹ (دوطرفہ بجائی کی صورت میں)
پودے سے پودے کا فاصلہ	1.5 فٹ

کھاد کا استعمال

زمین کی تیاری کے وقت	2 بوری ڈی اے پی + 2 بوری پوٹاش
فرٹی ہیوما	8 کلوگرام فی ایکڑ چھٹہ کریں
زنگرین	7.5 کلوگرام فی ایکڑ چھٹہ کریں
تیسری کھاد سے 15-20 دن بعد	1/2 بوری یوریا
فرٹی میکرو (15-15-15)	پھول آنے سے پہلے 1 کلوگرام فی ایکڑ سپرے کریں اور پھر 15 دن کے وقفے سے عمل دہرائیں
فرٹی کے 50	پھل بننے پر 2 کلوگرام فی ایکڑ اسپرے کریں اور پھر 10 دن کے وقفے سے عمل دہرائیں

کھاد کا استعمال زمین کی زرخیزی کو مدِنظر رکھتے ہوئے کریں۔

نوٹ: کمپنی صرف بیج کے اگاؤ اور خالص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی بیشی کی کمپنی ذمہ دار نہ ہوگی۔

لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ۔ ایگری سائنسز
63-مزنگ روڈ، لاہور۔ ہیلپ لائن: 0800-73337