

دوآبہ

40 فیصد ایس ای (w/w)

دھان کی شائدار
فصل کا ضامن



ICI PAKISTAN LTD.



DOABA

40% SE (w/w)

دھان خریف کی اہم نقد آور فصل ہے۔ پاکستان میں گندم کے بعد خوردنی اجناس میں دھان کی فصل سب سے زیادہ رقبہ پر کاشت کی جاتی ہے۔ دھان کی فی ایکڑ پیداوار میں کمی کی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک بڑی وجہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ جڑی بوٹیاں دھان کی پیداوار میں 20 سے 25 فیصد اور بعض حالات میں 50 فیصد تک کمی کا باعث بنتی ہیں۔

دھان کی سالانہ جڑی بوٹیاں



دوآبہ دو مختلف جڑی بوٹی مارزہروں پر مشتمل ایک منفرد اور جدید کیسما ہے جو کہ دھان کی فصل میں گھوڑا گھاس اور دیگر گھاس نما جڑی بوٹیوں کے علاوہ ڈیلا اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا اگنے سے پہلے ہی خاتمہ کر دیتا ہے۔

500 ملی لیٹر نی ایکڑ	ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیاں
	گھاس نما خاندان کی جڑی بوٹیاں
	چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں

طریقہ اثر

دوآبہ جڑی بوٹیوں کی جڑ، تنے اور پتوں کے ذریعے جذب ہو کر خلیوں کی تقسیم اور امائیٹو ایسڈز بنانے کے عمل میں معاون انزائم (Acetolactate Synthase) کی کارکردگی کو روک دیتا ہے جس سے جڑی بوٹیاں اگنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔

دوآبہ کی نمایاں خصوصیات

- دھان کی جڑی بوٹیوں (گھوڑا گھاس، ڈیلا، گھاس نما اور چوڑے پتوں والی)
- جدید اسپورٹڈ فارمولیشن۔ پانی میں فوراً حل پذیر
- کھیت میں کیساں پھیلاؤ، فصل لیے عرصے تک جڑی بوٹیوں سے پاک
- استعمال میں آسان
- زیادہ چھاڑ، زیادہ پیداوار
- فصل کی جڑوں کی بہتر نشوونما

محلول کی تیاری اور چھڑکاؤ کا طریقہ کار

- **دوآبہ** کی 500 ملی لیٹر بوتل میں 500 ملی لیٹر پانی میں حل کر کے محلول بنائیں
- **دوآبہ** کو پھیری منتقلی کے 1 سے 3 دن کے اندر کھڑے پانی میں چھڑکاؤ کریں
- **دوآبہ** کے استعمال کے بعد کھیت میں ایک ہفتے تک پانی کھڑا رکھیں
- اب اس تیار شدہ محلول کو ٹیکر بوتل میں ڈال کر پورے ایکڑ کے کھیت میں کیساں چھڑکاؤ کریں
- **دوآبہ** کے استعمال کے وقت کم از کم 2 انچ پانی کھڑا ہو

نوٹ: صرف (Transplanted Rice) لاب اپیری سے منتقل کی ہوئی فصل کیلئے

نوٹ: زہریلائی کے وقت کھیت میں بڑی عمر کی جڑی بوٹیاں ہرگز نہ ہوں



ICI PAKISTAN LTD.



آئی سی آئی پاکستان۔ ایگری سائنسز

ہیلاپ لائن نمبر: 0800-73337

