# دھان کی کاشت کیلئے شاندار ہائبرڈ بیج

# CD 30 | GIR 2

## جڑی بوٹیوں کی تلفی

پنیری کی منتقلی کے 1 سے 3 دن کے اندر جڑی بوٹیوں کو اُگنے سے پہلے کنٹرول کرنے کیلئے **دوآبہ** 500 ملی لیٹر فی ایکڑ چھڑکاؤ کریں۔

## کیڑوں کا تدارک

تنے کی سنڈی، پلانٹ ہاپر اور لیف فولڈر سے بچاؤ کے لئے **ایماڈوکس** 150 ملی لیٹر فی ایکڑ اسپرے کریں اور **ٹاپ رائس** 9 کلوگرام فی ایکڑ چھٹہ کریں۔

## آبپاشی کا عمل

پنیری کی منتقلی کے وقت کھیت میں کم از کم 2 انچ تک پانی کھڑا ہونا چاہیئے۔ اس کے بعد کھیت میں پانی 3 انچ سے زیادہ نہ ہو۔ مونجر نکلنے سے دانہ بننے تک پانی کی کمی نہ آنے دیں۔ کٹائی سے تقریباً 2 ہفتے پہلے پانی دینا بند کردیں۔

## فصل کی برداشت

جب مونجر سنہری مائل ہوجائے اور دانوں کی بھرائی مکمل ہوجائے تو فصل کی برداشت کی جاسکتی ہے۔

نوٹ: کمپنی صرف بیج کے اُگاؤ اور خالص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی بیشی کی کمپنی ذمہ دار نہ ہوگی۔

LCI
LUCKY CORE INDUSTRIES

#JourneyOfEnrichingLives

لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ۔ ایگری سائنسز

63-مزنگ روڈ، لاہور۔ ہیلپ لائن: 0800-73337

# CD 30

گرمی کے خلاف
بہترین قوت مدافعت

- بہترین پیداواری صلاحیت
- **100** سے **105** دن میں فصل پک کر تیار
- مضبوط تنا، فصل گرنے سے محفوظ
- زیادہ مونجر، فی پودا زیادہ دانے
- سخت موسمی حالات میں بہترین پیداوار
- کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف بہترین قوتِ برداشت

# GIR 2

جلد پک کر تیار
ہونے والی قسم

- زیادہ جھاڑ بنانے کی صلاحیت، فی پودا زیادہ دانے
- لمبے، وزن دار دانے، مارکیٹ میں قیمت زیادہ
- درمیانے قد کے پودے، فصل گرنے سے محفوظ
- کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت
- فصل 100 سے 105 دنوں میں پک کر تیار

## کاشت کیلئے سفارشات

### وقتِ کاشت

| | |
|---|---|
| پنجاب | وسط مئی۔ وسط جون |
| لوئر سندھ | آخر اپریل۔ جون |
| اپر سندھ | مئی۔ جون |

نوٹ: کاشتکار حضرات مقامی موسم کے مطابق وقتِ کاشت کا تعین کریں۔

### شرحِ بیج

5 کلوگرام فی ایکڑ

### پنیری کی تیاری

ایک ایکڑ ہائبرڈ دھان کی کاشت کیلئے 5-6 مرلہ رقبے پر پنیری کاشت کریں۔ بیج کو **سیگا بوائیٹ** 2 ملی لیٹر فی کلوگرام لگا کر کاشت کریں۔ کاشت کے 25 دن بعد پنیری کی کھیت میں منتقلی 4-5 پتوں کی حالت پہ کی جاسکتی ہے۔

### پنیری کی منتقلی

| | |
|---|---|
| قطاروں کا درمیانی فاصلہ | 7-8 انچ |
| پودوں کا درمیانی فاصلہ | 7-8 انچ |

فی ایکڑ پودوں کی مطلوبہ تعداد (90 ہزار۔ 1 لاکھ) کے حصول کیلئے پنیری منتقل کرتے وقت کھیت میں کم از کم 2 انچ تک پانی کھڑا ہونا چاہیئے اور فی سوراخ (Hill) 2 پودے لگائیں۔

### کھاد کا استعمال

کھادوں کا استعمال زمین کی زرخیزی اور ضرورت کو مدِنظر رکھتے ہوئے کریں۔

| | |
|---|---|
| زمین کی تیاری | 1 بوری ڈی اے پی + 1 بوری پوٹاش + **فرٹی ہیوما** 8 کلوگرام فی ایکڑ |
| **زنگرین** (دانے دار) | پنیری منتقلی کے 15 دن بعد 7.5 کلوگرام فی ایکڑ چھٹہ کریں |
| پنیری منتقلی کے 3 ہفتے بعد | 1 بوری یوریا |
| پنیری منتقلی کے 6 ہفتے بعد | 1 بوری یوریا |
| **فرٹی کے 50** یا **فرٹی کے (K)** | گوبھ کی حالت سے مونجر بننے سے پہلے 10 کلوگرام فی ایکڑ بذریعہ آبپاشی فلڈ کریں |
| | 3 لیٹر فی ایکڑ بذریعہ آبپاشی فلڈ کریں |

پنیری کی کاشت

پنیری کی کھیت میں منتقلی