

ہائی کارن 339

منافع بخش پیداوار --- خوشحال کاشتکار

موسمی مکئی کی کاشت کیلئے بہترین ہائبرڈ بیج

سنگل کر اس
ہائبرڈ بیج



ICI PAKISTAN LTD.

وقت برداشت

جب چھلیوں کے پردے خشک ہو جائیں اور دانے کے سرے پر کالا نشان نظر آنے لگے تو فصل برداشت کریں۔



ہائی کارن 339 سے بہترین پیداوار حاصل کرنے والے کاشتکار



ملک محمد اسلم
علاقہ میلیسی
پیداوار 108 من فی ایکڑ



حافظ محمد سجاد احمد
علاقہ میلیسی
پیداوار 117 من فی ایکڑ



ندیم احمد
علاقہ میلیسی
پیداوار 94 من فی ایکڑ



عبدالحمید اعوان
علاقہ وہاڑی
پیداوار 106 من فی ایکڑ



غلام نبی
علاقہ اوکاڑہ
پیداوار 90 من فی ایکڑ



ملک مستقیم
علاقہ کہروڑ پکا
پیداوار 90 من فی ایکڑ



ملک شوکت
علاقہ ملتان
پیداوار 85 من فی ایکڑ



ماسرور احمد اسماعیل
علاقہ عارف والہ
پیداوار 86 من فی ایکڑ



چوہدری عثمان ناصر
علاقہ میلیسی
پیداوار 560 من فی ایکڑ



ملک اشفاق احمد
علاقہ ملتان
پیداوار 600 من فی ایکڑ

63 مزگ روڈ، لاہور فون: 020-111-100-100 (042) ٹیکسٹ: سیلز نیچر: فہد القادر امیر 0301-8210361	سرینا ہوسٹل، کلب روڈ، فیصل آباد ریجنل سیلز نیچر: عمران باری 0301-8274379	4th فلور، 61 صدیق سینٹر (چھپس) ابدالی روڈ۔ ملتان فون: 061-4781344 ریجنل سیلز نیچر: نجیب الرحمن 0300-7359335	ملتان روڈ، باغیچہ انورس این بی عثمان، سایہ وال فون: 0404-502088 ریجنل سیلز نیچر: عاصم ندیم 0303-7774515	فلور نمبر 7، اسٹیٹ لائف بلڈنگ عسٹری سڑک، حیدرآباد فون: 022-2781180 سیلز نیچر: عبدالغفار خانزادہ 0300-8371300
--	--	---	---	--

آئی سی آئی پاکستان لینڈ
کے علاقائی دفاتر

نوٹ: کبھی صرف بیج کے آگے اور خالص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی بیشی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔



ICI PAKISTAN LTD.

مزید معلومات کیلئے

آئی سی آئی پاکستان لینڈ۔ ایگری ڈویژن

63-مزگ روڈ، لاہور ہیلپ لائن: 0800-73337



کھادوں کا استعمال

کھادوں کا استعمال زمین کی زرخیزی اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

زمن کی تیاری پر	تین سے چار چٹوں کی حالت	چھ سے آٹھ چٹوں کی حالت	دس سے بارہ چٹوں کی حالت	بورنگلے سے پہلے
2 بوری ڈی اے پی + 2 بوری پوناش یا 4 بوری ایس ایس پی + 1 بوری یوریا + 2 بوری پوناش	1 بوری یوریا	1 بوری یوریا	1 بوری یوریا	1 بوری یوریا
فٹن ہینیا 8 کلوگرام 1-2 کلوگرام فی ایکڑ اسپرے	فٹن میکرو 1-2 کلوگرام فی ایکڑ اسپرے	زنکریں 27% 7.5 کلو		فٹن کے 50 12.5 کلو
				

جڑی بوٹی اور کیڑوں کا تدارک

بھائی سے پہلے	بھائی کے بعد 24 گھنٹے کے اندر	تین چٹوں کی حالت	چھ چٹوں کی حالت	آٹھ چٹوں کی حالت
ایمازون 70% WS 7-10 گرام فی کلوچ	مینو لاگونڈ 96% EC 600-800 ملی لیٹر فی ایکڑ		نوٹس 5% SC 480 ملی لیٹر فی ایکڑ	ڈانی تھریں 10% EC 250 ملی لیٹر فی ایکڑ
				
			فل کنٹرول 50% WP 700-800 گرام فی ایکڑ	
				
			کارفیو G 3% 8 کلوگرام فی ایکڑ	کارفیو G 3% 8 کلوگرام فی ایکڑ
				
				ایما ڈوکس 9% SC 150-300 ملی لیٹر فی ایکڑ
				

نمایاں خصوصیات

- بہترین پیداواری صلاحیت
- کم و بیش 100-105 دن میں پک کر تیار
- سخت موسمی حالات برداشت کرنے کی صلاحیت
- سائیلج کیلئے موزوں ترین ہائبرڈ بیج
- دانوں کی بہترین شرح فیصد (Excellent Shelling Percentage)
- لمبے، وزن دار اور نارنجی رنگت کے دانے، مارکیٹ میں قیمت نسبتاً زیادہ
- درمیانہ قدر اور مضبوط جڑیں، فصل گرنے سے محفوظ
- فصل کی برداشت تک پودا سرسبز، چارے کے لئے قابل استعمال



زبردست پیداواری صلاحیت

لمبے دانے

کاشت کیلئے سفارشات

طریقہ کاشت

وسط جون - آخر اگست


وقت کاشت

مکئی کو کھیلویوں پہ بذر لیچ چوپہ کاشت کریں۔

پودوں کی تعداد 28-29 ہزار فی ایکڑ (بہترین پیداوار حاصل کرنے کیلئے فی ایکڑ پودوں کی مطلوبہ تعداد پوری کریں)

پودوں کی تعداد

* مقامی موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کاشت میں تبدیلی کی جاسکتی ہے



پودے سے پودے کا فاصلہ 8-9 اچ



قطاروں کا درمیانی فاصلہ 2.25-2.5 فٹ رہیں



بذر لیچ چوپہ کاشت کریں
چ کی گہرائی 1.5 سے 2 اچ رہیں

آپاشی کا عمل

پہلا پانی کاشت کے 3 سے 5 دن کے اندر لگائیں۔ پھر موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتہ وار آپاشی کریں۔

زیرگی کے عمل (Pollination) کے دوران پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔