

ہائی کاربن 11 پلس

کمٹی کاڈل کر اس ہا سمر ڈیج

دانوں، سالیج اور سبز چھلیوں کیلئے بہترین انتخاب



فون: 0800-73337
63-مزنگ روڈ، لاہور۔ ہیلپ لائن: 0800-73337



#JourneyOfEnrichingLives

آپاشی کا عمل

کھلیوں پر پانی لگا کر وتر حالت میں بیجائی کریں۔ بیجائی کے بعد پہلا پانی تین سے چار دن میں مکمل کریں۔ زمین کی ساخت، فصل کی ضرورت اور موسم کے مطابق پانی کے وقفے میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ سڑکھنے سے دانہ بننے تک پانی کی کمی نہ آنے دیں۔

کیڑے اور ان کا تدارک

- (1) شوٹ فلائی سے بچاؤ کیلئے **سیگا برائیٹ** 36 فی لیٹر 10 ملی لیٹر فی کلوگرام بیج کو لگا کر کاشت کریں
- (2) فصل کے ابتدائی ایام میں شوٹ فلائی کے حملے کی صورت میں **اکیڈو** 200-250 ملی لیٹر فی ایکڑ اسپرے کریں
- (3) گڑواں (Stem Borer) سے بچاؤ کیلئے 6 کلوگرام **نوٹس**، 60 فی لیٹر پودے کی کونپلوں میں ڈالیں
- (4) فال آرمی ورم کے تدارک کیلئے **ایما ڈوکس** 9 فی لیٹر 150-200 ملی لیٹر فی ایکڑ اسپرے کریں

جزی بوٹیوں کا انسداد

فصل کو پہلا پانی لگانے کے بعد جب کھیت میں تمام جزی بوٹیاں اُگ چکی ہوں تو **فل کنٹرول** 500-700 گرام فی ایکڑ وتر حالت میں اسپرے کریں۔

کمٹی کی برداشت

دانے کے سرے پر کالا نشان نظر آنے لگے اور جھلیوں کے پردے خشک ہو کر لٹک جائیں۔ سالیج کیلئے اس وقت فصل برداشت کریں جب دانے کی دودھیالائن دانے کے 1/2 حصہ پر پہنچ جائے۔



دودھیالائن 1/2 حصہ تک ہونی چاہیے



دانے کے سرے پر کالا نشان

نوٹ: کھیتی صرف بیج کے آگے اور خالص بن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی بیشی کی کھیتی ذمہ دار نہ ہوگی۔

63-مزنگ روڈ، لاہور۔ ہیلپ لائن: 0800-73337

کمٹی کو رائڈ سٹر پر لمیٹڈ۔ ایگری سائنسز



نمایاں خصوصیات

- ☆ عمدہ پیداواری صلاحیت
- ☆ مضبوط جڑیں، فصل گرنے سے محفوظ
- ☆ سُرخ مائل رنگت کی سرے تک دانوں سے بھری ہوئی چھلیاں
- ☆ لمبی اور یکساں سائز کی چھلیاں
- ☆ ہر طرح کی آب و ہوا میں کاشت کیلئے موزوں
- ☆ زیادہ گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت
- ☆ پیاریوں اور کیڑوں کے خلاف قوت برداشت
- ☆ تھما کواور آلو کی فصل کے ساتھ ہیر پھیر کیلئے نہایت موزوں



سُرخ مائل رنگت کے خوشنما دانے


ہائی کارن 11 پلس سائیلج کیلئے بہترین انتخاب



چوڑے پتے



زیادہ ہائیو ماس



بہترین سائیلج

- ☆ سرسبز پودا ہونا، تاہا، ہائیو ماس زیادہ
- ☆ پتے کا تنے سے تناسب زیادہ
- ☆ جانوروں کیلئے زود ہضم اور ذائقے میں عمدہ
- ☆ خشک مادہ اور انانج کا بہترین استخراج
- ☆ سال میں دو سے تین مرتبہ سائیلج کیلئے کاشت کی جاسکتی ہے

وقت کاشت

موسم بہار	موسم خزاں
جنوری - مارچ	آخر جون - اگست

نوٹ: موسمی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کاشتکار مہارت و توجہ کاشت کا تین کریں۔ سبز چھلیوں کیلئے آفرگسٹ تک کاشت کی جاسکتی ہے۔

طریقہ کاشت

مکنی کی کاشت کھیلوں پر بذریعہ چوپہ کریں۔

قطاروں کا درمیانی فاصلہ	2.25-2.5 فٹ
پودے سے پودے کا فاصلہ	دانوں کیلئے 18 انچ سائیلج کیلئے 7 انچ

پودوں کی تعداد

سائیلج کیلئے	دانوں کیلئے
32-30 ہزار فی ایکڑ	26-29 ہزار فی ایکڑ



پودوں کا درمیانی فاصلہ

قطاروں کا درمیانی فاصلہ

بذریعہ چوپہ کاشت

کھاد کا استعمال

بیجائی کے وقت	2 ہوری ڈی اے پی + 1/2 ہوری یوریا + 2 ہوری پوناش یا 5 ہوری ایس ایس پی + 1 ہوری یوریا + 2 ہوری پوناش یا 3 ہوری نائٹرو فاس + 2 ہوری پوناش
نائٹرو پوناش	8 گلوگرام بوقت بیجائی یا پہلے پانی کے ساتھ استعمال کریں
1 فٹ کی فصل	1 ہوری یوریا + 7.5 گلوگرام فی ایکڑ ڈنگرین دانے دار
2 فٹ کی فصل	1 ہوری یوریا
3 فٹ کی فصل	1.5 ہوری یوریا
فرٹی میکرو	2-1 گلوگرام فی ایکڑ 30-35 دن کی فصل پر اسپرے کریں
فرٹی کے 60	گوہ سے پہلے 10 گلوگرام فی ایکڑ لگائیں

کھادوں کا استعمال زمین کی زرخیزی اور ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے کریں۔

شرح

سائیلج کیلئے	دانوں کیلئے
10 گلوگرام فی ایکڑ	8 گلوگرام فی ایکڑ