

ICI-2121

کیاس کی جدید ترین قسم
زیادہ پیداوار، زیادہ منافع



آپاشی کا عمل

آپاشی زمین کی زرخیزی، طریقہ کاشت، موسمی حالات اور فصل کی حالت کو مد نظر رکھ کر کی جائے۔ پانی کی کمی کی علامات جس میں سفید پھول کا چوٹی پر آنا، اوپر والی شاخوں کی درمیانی لمبائی میں کمی اور چوٹی کے پتوں کا کھر درا ہونا شامل ہے۔

پٹریوں/کھلیوں پر کاشت کیلئے: بوائی کے بعد پہلا پانی 3 تا 4 دن، دوسرا، تیسرا اور چوتھا پانی 6 تا 9 دن کے وقفے سے کریں اور بقیہ پانی 12 دن کے وقفے سے لگائیں اور آخری پانی 15 اکتوبر کو لگادیں۔

نوٹ: موسم کے مطابق آپاشی کے وقفے میں ردوبدل کی جاسکتی ہے۔

چنائی کا عمل

● صرف اچھی طرح کھلے ہوئے ٹینڈوں کی چنائی کی جائے

● پہلی چنائی جلدی مکمل کر لیں

● دوسری چنائی 40 سے 50 فیصد ٹینڈے کھلنے پر کریں

● کیاس چننے کے بعد کھیت میں بھیڑ بکریاں چرنے کیلئے چھوڑ دیں تاکہ وہ بچے کھچے ٹینڈے وغیرہ کھا جائیں اور

اس طرح ان میں موجود سنڈیاں تلف ہو جائیں گی

● کیاس کی چنائی کے بعد چھڑیوں کو کھیت میں روٹاویٹر سے دبا دیں

نوٹ: کھیتی صرف بیج کے اکاؤنڈ اور خاص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا احصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی کی کوئی ذمہ دار نہ ہوگی۔ خریدتے وقت ٹھیلے پر سیکورٹی سٹیکر ضرور دیکھیں۔



ICI PAKISTAN LTD.



ICI PAKISTAN LTD.



آئی سی آئی پاکستان۔ ایگری سائنسز

ہیلپ لائن نمبر: 0800-73337





تظار سے تظار کا فاصلہ	30 انچ (2.5 فٹ)
پودے سے پودے کا فاصلہ	12 تا 15 انچ (1 تا 1.25 فٹ)
بیج کی گہرائی	2 انچ

کھادوں کا استعمال

زمین کی تیاری کے وقت	1.5 تا 2 بوری ڈی اے پی + 1 بوری ایس او پی + فرٹی ہیوما 8 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں
پہلی ڈوڈی نمودار ہونے پر	آدھی بوری یوریا 3 تا 7.5 کلوگرام فی ایکڑ زنگرین کا استعمال کریں
پہلے پھول کا نمودار ہونا	1 بوری یوریا 2 کلوگرام فی ایکڑ سلفوم کا استعمال کریں
پھول گڈی کا جو بن پر ہونا	1 بوری یوریا آپاشی کے ساتھ دیں اور فرٹی میکرو 1 کلوگرام فی ایکڑ اسپرے کریں
فرٹی گولڈ	ٹینڈے بننے کے عمل کے دوران 10 کلوگرام فی ایکڑ بذریعہ آپاشی دیں
فرٹی کے 50	بھر پور پھل کے دوران 10 سے 15 دن کے وقفے سے دو کلوگرام فی ایکڑ اسپرے کریں

نوٹ: کھاد کا استعمال زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

اچھی پیداوار کیلئے اہم ہدایات

- بوائی سے پہلے بیج کو **سیگا برائیس** سے زہر آلود کر لیں
- چھدرائی کا عمل بوائی سے 20-25 دن کے اندر ہر صورت مکمل کر لیں
- جڑی بوٹیوں کو بروقت تلف کریں
- کھادوں کا متوازن استعمال کریں
- نقصان دہ کیڑوں کے موثر تدارک کیلئے ہفتے میں ایک بار پیسٹ سکاؤٹنگ کریں اور سفارش کردہ زہر اسپرے کریں
- اسپرے صبح اور شام کے وقت کریں



آئی سی آئی 2121 کی نمایاں خصوصیات

- گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت
- رس چوسنے والے کیڑوں کے خلاف قوتِ مدافعت
- پتہ مروڑ وائرس کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت
- جلد پھل آور اور رائی
- ٹینڈوں کا گچھوں کی صورت میں بننا
- پودے کے آخری سرے تک ٹینڈوں کا بننا
- بہترین پیداواری صلاحیت



کاشت کیلئے سفارشات

زیریں سندھ	یکم اپریل تا پچیس (25) اپریل
بالائی سندھ	یکم مئی تا پچیس (25) مئی

وقتِ کاشت

نوٹ: بجائی کا فیصلہ اپنے مقامی موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں

شرح بیج 10 کلوگرام فی ایکڑ

طریقہ کاشت

بہترین پیداواری نتائج حاصل کرنے کیلئے اسے پٹر یوں پر کاشت کریں۔