

آپاشی کا عمل


آپاشی زمین کی زرخیزی، طریقہ کاشت، موگی حالات اور فصل کی حالت کو مدد نظر رکھ کر کی جائے۔ پانی کی کمی کی علامات جس میں سفید پھول کا چوتھی پر آنا، اوپر والی شاخوں کی درمیانی لمبائی میں کمی اور چوتھی کے پتوں کا کھردرا ہونا شامل ہے۔

پھر یوں اکھیلیوں پر کاشت کیلئے: بوائی کے بعد پہلا پانی 3 تا 4 دن، دوسرا، تیسرا اور چوتھا پانی 6 تا 9 دن کے وقفے سے کریں اور بقیہ پانی 12 دن کے وقفے سے لگائیں اور آخری پانی 15 اکتوبر کو لگادیں۔
نوٹ: موسم کے مطابق آپاشی کے وقفے میں روبدل کی جائیں گے۔

چنانی کا عمل

- صرف اچھی طرح کھلے ہوئے ٹینڈوں کی چنانی کی جائے
- پہلی چنانی جلدی مکمل کر لیں
- دوسری چنانی 40 سے 50 فیصد ٹینڈے کھلنے پر کریں
- کپاس چننے کے بعد کھیت میں بھیڑ بکریاں چرنے کیلئے چھوڑ دیں تاکہ وہ بچے کھجے ٹینڈے وغیرہ کھا جائیں اور اس طرح ان میں موجود سندیاں تلف ہو جائیں گی
- کپاس کی چنانی کے بعد چھڑیوں کو کھیت میں روٹاویٹ سے دبادیں

فوٹو: کمپنی کے کاموں میں کی خاص دیکھی ہے۔ یہ اکابر بہت سے قدری موال پورے ہے اس لئے یہاں کمپنی کی کمکی اسی وجہ کی خوبی تھی۔ اس کی وجہ پر کمپنی ملکیت نہ رکھ رہی تھی۔



0800-73337-63 - مرگ روڈ، لاہور۔ ہلپ لائن:



لکی کور انڈسٹریز لیمیٹڈ۔ ایگری سائنسز

آئی سی آئی 2121 کی نمایاں خصوصیات

- گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت
- رس چونے والے کیڑوں کے خلاف قوتِ مدافعت
- پتہ مروڑ و ارٹس کے خلاف بہترین قوتِ مدافعت
- جلد پھل آور رائحتی
- ٹینڈوں کا چکھوں کی صورت میں بننا
- پودے کے آخری سرے تک ٹینڈوں کا بننا
- بہترین پیداواری صلاحیت



کاشت کیلئے سفارشات

وقتِ کاشت	زیریں سندھ کیم اپریل تا چپیس (25) اپریل	بالائی سندھ کیم مئی تا چپیس (25) مئی
-----------	--	---

نوت: بجائی کافی عمل اپنے مقامی موسم کو مدد نظر رکھتے ہوئے کریں

شرح بیج 10 کلوگرام فی ایکڑ

طریقہ کاشت

بہترین پیداواری نتائج حاصل کرنے کیلئے اسے پڑیوں پر کاشت کریں۔

کھادوں کا استعمال

زین کی تیاری کے وقت 2 تا 1.5 بوری ڈی اے پی + 1 بوری ایس او پی + فرٹی ہیوما 8 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں	پھلی ڈوڈی نمودار ہونے پر
آدھی بوری یوریا 3 تا 7.5 کلوگرام فی ایکڑ زنگریں کا استعمال کریں	پہلی پھول کا نمودار ہونا
1 بوری یوریا 2 کلوگرام فی ایکڑ سلفوم کا استعمال کریں	پھول گذی کا جوبن پر ہونا
1 بوری یوریا آپاشی کے ساتھ دیں اور فوٹی میکرو 1 کلوگرام فی ایکڑ اسپرے کریں	فروٹی گولڈ
ٹینڈے بننے کے عمل کے دوران 10 سے 15 دن کے قدر سے دو کلوگرام فی ایکڑ اسپرے کریں	فرٹی کے 50
بھر پور پھل کے دوران 10 سے 15 دن کے قدر سے دو کلوگرام فی ایکڑ اسپرے کریں	

نوت: کھاد کا استعمال زین کی زرخیزی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

اچھی پیداوار کیلئے اہم ہدایات

- بوائی سے پہلے بیج کو سیکا برانیس سے زہر آلوکر لیں
- چھدرائی کا عمل بوائی سے 20-25 دن کے اندر ہر صورت مکمل کر لیں
- جڑی بیٹیوں کو بروقت تلف کریں
- کھادوں کا متوازن استعمال کریں
- نقصان دہ کیڑوں کے موثر تدارک کیلئے ہفتے میں ایک بار پیسٹ سکاؤ نگ کریں اور سفارش کردہ زہر اسپرے کریں
- اسپرے صبح اور شام کے وقت کریں

