

ہائی سن 33 ہائی سن 39 اگیوارا-4

خوشحال کسان۔۔۔ خود کفیل پاکستان

زیادہ پیداوار۔۔۔ منافع بے شمار



لوئر سندھ میں کاشت کے لئے سفارشات

لوئر سندھ (ٹھٹھہ، بدین) کے علاقے میں بہتر پیداوار حاصل کرنے کیلئے مندرجہ ذیل سفارشات پر عمل کریں۔

- ★ زمین کی بہترین تیاری کے لئے دو سے تین سال بعد ایک مرتبہ چیل ہل چلائیں۔
- ★ کھاد کی تمام سفارش کردہ مقدار بیجائی کے وقت استعمال کریں۔
- ★ کھاد کا چھٹہ کرنے کی بجائے بیج کے ساتھ ڈرل کریں لیکن خیال رہے کہ بیج اور کھاد ایک ہی جگہ پر ڈرل نہ ہوں۔
- ★ کھاد بیج سے کم از کم 3 انچ کے فاصلے پر ہونی بیج کی گہرائی 3 انچ تک رکھیں۔
- ★ 2-3 مرتبہ 1-2 فیصد یوریا کا محلول بنا کر سپرے کرنے سے پیداوار میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔

مخلوط کاشت (کھاد کے ساتھ)



مشاہدات سے ثابت ہوا ہے کہ سورج مکھی کو کھاد کے ساتھ بھی کامیابی کے ساتھ کاشت کیا جاسکتا ہے۔ جہاں پر کھاد کا قطار سے قطار کا فاصلہ ڈھائی فٹ ہو وہاں کھاد کی ایک قطار چھوڑ کر اس میں سورج مکھی کاشت کی جائے۔ اس طرح ایک ایکڑ کھاد میں آدھا ایکڑ سورج مکھی کاشت ہوگی۔ نتیجتاً کھاد کی فصل پر کوئی منفی اثر نہیں آئے گا اور زمیندار کی آمدنی میں اضافہ بھی ہوگا۔

وقت کاشت	پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور بالائی سندھ	فروری کاشت کھاد کے ساتھ
	زیریں سندھ	ستمبر تا دسمبر کاشت کھاد کے ساتھ
کھاد کا استعمال	بیجائی کے وقت	1 بوری ڈی اے پی (اضافی)، 1 بوری ایس او پی (اضافی)
	دوسرے پانی کے ساتھ	1/2 بوری یوریا (اضافی)
	پھول نکلنے پر	ایک چوتھائی بوری یوریا (اضافی)

نوٹ: کمپنی صرف بیج کے اگاؤ اور خالص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی کمپنی ذمہ دار نہ ہوگی۔

لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ۔ اگیرو سائنسز

63- مزنگ روڈ لاہور۔

ہیلپ لائن: 0800-73337



کھاد کا استعمال

بیجائی کے وقت	1 بوری ڈی اے پی + 1/2 بوری یوریا + 1 بوری ایس او پی یا 2 بوری نائٹرو فاس + 1 بوری ایس او پی یا 2 1/2 بوری سنگل سپر فاسفیٹ + 1 بوری یوریا + 1 بوری ایس او پی
فرٹی ہیسوما (پوٹاشیم ہیومیٹ)	8 کلوگرام فی ایکڑ بیجائی کے وقت استعمال کریں
پہلے پانی کے ساتھ	1/2 بوری یوریا + 7 1/2 کلوگرام فی ایکڑ زنگوین
پھول بننے وقت	1/2 بوری یوریا
فرٹی میکرو (15-15-15)	2-1 کلوگرام پھول آنے سے پہلے اسپرے کریں
فرٹی کے 50	پھول بننے وقت 10 کلوگرام فی ایکڑ فلڈ کریں

نوٹ: کھاد کا استعمال زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

آبیاری کا عمل

پہلا پانی	بیج پھوٹنے کے 30 دن بعد
دوسرا پانی	پہلے پانی کے 15 سے 20 دن بعد
تیسرا پانی	پھول بننے وقت
چوتھا پانی	بیج بننے وقت
پانچواں پانی	چوتھے پانی کے 15 دن بعد

نوٹ: موسمی حالات اور بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کی مقدار اور وقفے میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے

نیز بیج بننے کے دوران پانی کی کمی ہرگز نہ آنے دیں۔

کٹائی

(الف) جب پھول میں دانے بننے کا عمل مکمل ہو چکا ہو۔ اور پہلی پیتاں بھورے رنگ کی ہو جائیں تو پانی کا وقفہ بڑھا دیں۔

(ب) جب پھول کی پیتاں بھورے رنگ کی ہو کر گرجائیں اور پھول کی پشت سبز سے زرد رنگ کی ہو جائے تو فصل برداشت کے قابل ہو جاتی ہے۔ کٹائی کا عمل ہاتھ سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ اگر فصل کی برداشت کمبائن ہارویسٹر سے کرنی ہو تو پانی بالکل روک دیں اور پودوں کو خشک ہونے دیں۔



نمایاں خصوصیات

ہائی سن 33

- ★ پاکستان میں سب سے زیادہ کاشت ہونے والا سورج مکھی کا باہر بیج
- ★ بہترین پیداواری صلاحیت
- ★ بہتر خود افزائی صلاحیت
- ★ زیادہ روغنی اجزاء کی ضمانت
- ★ پھولوں کا مناسب جھکاؤ، پرندوں سے محفوظ
- ★ دانوں سے بھرے ہوئے ٹھوس پھول، دانے وزن دار
- ★ گرمی اور پانی کی کمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت
- ★ (دونوں عوامل مل کر پیداوار میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں)
- ★ بیماریوں کے خلاف قوت برداشت، صحت مند فصل



ہائی سن 39

- ★ زیادہ پیداواری صلاحیت
- ★ بہترین خود افزائی صلاحیت
- ★ پھول کا مناسب جھکاؤ پرندوں سے محفوظ
- ★ دانوں سے مکمل بھرے ہوئے پھول
- ★ زیادہ روغنی اجزاء کی ضمانت
- ★ پانی کی کمی کا مقابلہ کرنے کی بہترین صلاحیت
- ★ دانہ بننے سے پکنے تک پودے میں نمی برقرار رہنے کی صلاحیت
- ★ مختلف موسمی حالات میں پیداوار بہترین
- ★ بیماریوں کے خلاف قوت برداشت

ایگوارا-4

- ★ بہترین پیداواری صلاحیت
- ★ بہترین خود افزائی صلاحیت
- ★ درمیانے قد کے پودے، فصل گرنے سے محفوظ
- ★ پھولوں کا مناسب جھکاؤ
- ★ زیادہ روغنی اجزاء کی ضمانت
- ★ بیماریوں کے خلاف قوت برداشت



کاشت کے لئے سفارشات

وقت کاشت

علاقہ	خزاں کی فصل	بہار کی فصل
لوئر سندھ	جولائی تا اگست	نومبر تا جنوری
اُپر سندھ	جولائی تا ستمبر	دسمبر تا فروری
بلوچستان	جولائی تا اگست	جنوری تا مارچ

نوٹ: کاشتکار حضرات موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کاشت کا تعین کریں۔

شرح بیج 2 کلوگرام/ایکڑ

طریقہ کاشت

سورج مکھی کی کاشت کاٹن ڈرل یا سورج مکھی پلانٹر سے سیدی قطاروں میں کریں۔ اسکے علاوہ سورج مکھی کو کھیلپوں پر بھی کاشت کیا جاسکتا ہے۔ سورج مکھی کو بذریعہ چھٹے ہرگز کاشت نہ کریں۔ نقصان کی صورت میں کمپنی ہرگز ذمہ دار نہ ہوگی۔

بیج کی گہرائی 1.5-2 انچ رکھیں



اچھی پیداوار کے لئے اہم ہدایات

سورج مکھی کی بہترین پیداوار کے حصول کے لئے کھیت میں پودوں کی مطلوبہ تعداد برقرار رکھنا انتہائی ضروری عمل ہے۔ اگر مطلوبہ پودوں کی تعداد اور چھدرائی کے عمل پر توجہ نہ دی جائے تو پیداوار پہ اس کا اثر منفی ہوتا ہے۔ لہذا 4-6 پتوں کے مرحلے پر کھیت میں چھدرائی کا عمل لازماً کریں اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 8-9 انچ کر دیں۔ اس طرح آبپاشی علاقوں میں پودوں کی تعداد 22-25 ہزار فی ایکڑ اور بدین، ٹھٹھہ کے علاقوں میں 18-20 ہزار فی ایکڑ حاصل کریں اور سورج مکھی کی فصل سے بھرپور منافع حاصل کریں۔



پودوں کا درمیانی فاصلہ 8-9 انچ برقرار رکھیں



چھدرائی کا عمل