



# نیہا ہائبرڈ شاندار کسان بنے مال دار

## ایڈونٹا F1 1225 ایڈونٹا F1 1247

- کھیت میں منتقلی کے 60 سے 65 دن بعد پھل چٹائی کیلئے تیار
- پھل کا اوسط وزن 120 سے 125 گرام تک
- بہترین شیلیف لائف، دور دراز کی منڈیوں تک رسائی آسان
- چمکدار گہرے سرخ رنگ کا چوکور نما پھل
- سخت موسمی حالات، بیماریوں اور وائرس کے خلاف بہترین قوت مدافعت

- بھرپور پیداواری صلاحیت
- پھل کا اوسطاً وزن 120 سے 140 گرام تک
- چمکدار گہرے سرخ رنگ کا چوکور نما پھل
- بہترین شیلیف لائف
- سخت موسمی حالات، بیماریوں اور وائرس کے خلاف بہترین قوت مدافعت



شرح تفصیل 60 گرام فی ایکڑ  
پودوں کی تعداد 9000-10000 فی ایکڑ

مہاپ	سندھ	نمبر پختہ ٹوڈو	بلوچستان
اکتوبر نومبر	جون-اگست	نومبر	فروری

نوٹ: مہائی کا فیصلہ اپنے مقامی موسم اور علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

زمین سے تقریباً ایک فٹ اونچے، 4 فٹ چوڑے اور 10 فٹ لمبے بیڈز بنائیں۔ چوڑائی کے سرخ آدھا چمک گہری لائیکس بنائیں جن کا درمیانی فاصلہ کم از کم 14 انچ ہو۔ پتوں میں اس طرح 13 انچ کے ایک دو سرے کے اوپر نہ آئیں۔ بیماری کی کھیت میں متغلی 4-6 پتوں پر کریں۔



کھیت میں منتقلی قطار سے قطار کا فاصلہ 8 فٹ (دو طرف مہائی) پودے سے پودے کا فاصلہ 1.5 فٹ

2 ہوری ڈی ایس پی + 2 ہوری پوناش	زمین کی تیاری کے وقت پھونکیں
ایک ہوری پوناش	دوسرے پانی کے ساتھ ہڈی کریں
ایک ہوری پوناش	دوسری کھاد کے 15 سے 20 دن بعد ہڈی کریں
فرٹی ٹیکو (15-15-15 + نی ای)	1 سے 2 کلوگرام فی ایکڑ پھول آنے سے پہلے پھیرے کریں
فرٹی کے 50	1 سے 2 کلوگرام فی ایکڑ پھل بننے پر پھیرے کریں اور 10 دن کے وقفے سے پھیرے دہرائیں

کھاد کا استعمال

نوٹ: کھاد کا استعمال زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

کیزوں اور ان کا تدارک کیزوں کے سطح کی صورت میں گی کورنڈسٹریٹ لمیٹڈ کے نمائندوں کے مشورے سے مناسب ادویات کا استعمال کریں۔

سہزیات کے نئے آنے والے بہترین ہائبرڈ بیج



پروسیڈنگ ٹمائٹر ماروکوڈو پارتھینو کارپک کھیرا خربوزہ ماروکوڈو بلٹ ٹائپ مرچ

نوٹ: کھان صرف بیج کے کاغذ اور خاص پن کی حفاظت دیتی ہے۔ پیداوار کا نمونہ بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لئے پیداوار میں کمی کی کھان کی کھان نہ ہوگی۔

