


نیہا ہائبرڈ شاندار کسان بنے مال دار

ایڈونٹا F1 1203

- دونوں موسموں میں کاشت کے لئے بہترین
- Inderterminate قسم کا ہائبرڈ
- ٹیل دار ٹماٹر لمبے عرصے تک پھل دینے کی صلاحیت
- 80 سے 85 دن بعد پھلی چٹائی
- TMV, TYLCV اور BW کے خلاف قوت برداشت
- 80 سے 85 دن بعد پھلی چٹائی
- گرمیوں میں بھی پھل اٹھانے کی بھرپور صلاحیت
- سخت، سرخ اور چوکور نما گول پھل
- بہترین Shelf Life کی وجہ سے دور دراز کی منڈیوں تک آسان رسائی
- پھل کا اوسط وزن 120 سے 130 گرام



#JourneyOfEnrichingLives



شرح بیج 10000 فی ایکڑ

پودوں کی تعداد 9000-10000 فی ایکڑ

بلوچستان	خیبر پختونخواہ	سندھ	پنجاب
فروری	نومبر-دسمبر/جن-جون	اگست	اکتوبر-نومبر

نوٹ: بہائی کا فیصلہ اپنے مقامی موسم اور علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

وقت کاشت

پھیری کی تیاری

زمین سے تقریباً ایک فٹ اونچے 4 فٹ چوڑے اور 10 فٹ لمبے بیڈز بنائیں۔ چوڑائی کے رخ آدھا بیج گہری لائنیں بنائیں جن کا درمیانی فاصلہ کم از کم 14 انچ ہو۔ بیج ان لائنوں میں اس طرح ڈالیں کہ ایک دوسرے کے اوپر نہ آئیں۔ ہیری کی کھیت میں 4-6 چٹوں پر کریں۔



پودے سے پودے کا فاصلہ 1.5 فٹ

6 فٹ (دو طرفہ بہائی)

تھار سے تھار کا فاصلہ

کیسٹ میں منتقلی

2 بوری ڈی اسے پی + 2 بوری پوتاش	زمین کی تیاری کے وقت چھڑ کریں
ایک بوری یوریا	دوسرے پانی کے ساتھ فلڈ کریں
ایک بوری یوریا	دوسری کھاد کے 15 سے 20 دن بعد فلڈ کریں
فرٹی میکرو (15-15-15 + پی ای)	1 سے 2 کلگرام فی ایکڑ پھول آنے سے پہلے اپرے کریں
فرٹی کے 50	1 سے 2 کلگرام فی ایکڑ پھل بننے پر اپرے کریں اور 10 دن کے وقفے سے اپرے ہر ایس

کھاد کا استعمال

نوٹ: کھاد کا استعمال زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔

کیڑے اور ان کا تدارک کیڑوں کے حملے کی صورت میں گی کورائلٹسز پر لمیٹڈ کے فائنڈ کے مشورے سے مناسب ادویات کا استعمال کریں۔

سبزیات کے نئے آنے والے بہترین ہائبرڈ بیج



بلٹ ٹامیپ مرچ ماروکو خربوزہ پارٹینو کارپک کھیرا ماروکو پروسیڈنگ ٹماٹر

نوٹ: کھیتی صرف بیج کے اگاد اور خاص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیو اوار کا احصار بہت سے قدرتی عوامل پر منحصر ہے اس لیے پیو اوار میں کمی بیشی کی کھیتی ضرور دانت ہوگی۔

گی کورائلٹسز پر لمیٹڈ، انگریزی سائینسز
63-مرنگ روڈ لاہور
ہیپ لائن: 0800-73337

